


Annexes : Données canicule



Nombre d'épisodes de chaleur et de canicules par an


Nombre d'épisodes distincts (≥3 jours) par an — complète les graphiques de jours cumulés ci-dessous en montrant si la chaleur arrive en plus d'épisodes séparés, pas seulement en plus de jours.



Les canicules (nuit ≥19°C & jour ≥34°C) étaient quasi absentes avant 2018 (seulement 2003 et 2006) ; elles deviennent régulières depuis. La hausse des jours cumulés observée par ailleurs est donc portée par davantage d'épisodes distincts, pas uniquement par des épisodes individuellement plus longs.

Écart de la température moyenne estivale (juin-juillet-août) à la référence des 30 dernières années

Station Dijon-Longvic, 1959-2026 — température moyenne quotidienne (TM), écart à la moyenne JJA 1991-2020 (normale climatologique standard, identique à celle utilisée pour le graphique OMM ci-dessous). Format identique à la publication Météo-France (écart annuel à 1961-1990), adapté ici à l'été.



2026 (partiel, jusqu'au 26/08) affiche déjà l'écart le plus élevé de la série : +4,43°C, devant 2003 (+3,66°C). La moyenne glissante sur 11 ans (centrée) ne peut pas être calculée sur les 5 dernières années (il faudrait des données jusqu'en 2031).